R ǂ X s O

} ' J m j J

e J v

H c @ ... A,B ″ B

James E. Gubernatis

A ´ R w @ w E ¤

B Los Alamos National Laboratory

} J ″ ^

$$H = -\sum_{\alpha=1,2} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}\, \sigma_i^{(\alpha)} \sigma_j^{(\alpha)}$$

$J_{ij} = \pm 1$ i ¯ Ł j

I [o [b v ˇ

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^{(1)} \sigma_i^{(2)}$$



Æ • «



ˇ " z



ˇ " z (•



} ' J m j J E e J



} C N J m j JF Æ G l M ["

J m j J F G l M ["' ☆ ‰ A

@ @ @ @ @ @ ' R G l [M ‹ ¤ ǂ

} ' J m j JF ' G l M [Œ l ›

æ ˇ } ' J m j J@

æ ˇ q X g O $h(E,q)$ %



(*) Monovariate multicanonical
Berg & Janke, PRL**80**, 4771 ('98)

E ˇ } ' J m j J@



æ ˇ §$D(E,q)$



˘

- æ ˇ } ' J mJj E
  @ @ @ @ @ e J @
  @→ : $\tau \sim N$
- Æ • « ¿
  @→$P(q;\ T=0.3)$ ″
  @ @ @ @ @ @ t H ' x

Aoyama+ v

æ R s ARK

Dual Pentium II 350MHz 69

Fast Ethernet 100Mbps

X C b ' O E 24Gbps

RAID f B X N100B

- ‹ x @ 6fbps

http://www.phys.aoyama.ac.jp/~aoyama+